

Denominación del indicador	Tasa de mortalidad por tuberculosis, VIH y hepatitis por tipo de enfermedad
Objetivo	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
Definición	Tasa de mortalidad estandarizada de determinadas enfermedades transmisibles. La tasa se calcula dividiendo el número de personas que mueren debido a la tuberculosis, el VIH y la hepatitis por la población total. Este valor es entonces ponderado con la población estándar europea.
Unidad de medida	Número por 100.000 personas
Fuentes de información	Sustainable Development Indicators, Eurostat Causes of death, Eurostat
Periodicidad	Anual
Ámbito geográfico	Regional, Nacional y Europeo
Desagregaciones	Tipo de enfermedad
Serie disponible	Andalucía: 2000-último dato disponible Eurostat: 2000-último dato disponible
Observaciones	Los datos se presentan como tasas de mortalidad estandarizadas, lo que significa que se ajustan a una distribución por edades estándar para medir las tasas de mortalidad independientemente de las diferentes estructuras de edad de las poblaciones. Este enfoque mejora la comparabilidad en el tiempo y entre países. Las tasas de mortalidad estandarizadas que se utilizan aquí se calculan sobre la base de una población europea estándar.